

Anlage 2: Pflegekonzept der einzelnen Maßnahmentypen

Biotoptyp	Pflegemaßnahme	Frequenz / Zeitraum
Wiesenflächen	<ul style="list-style-type: none"> - Nach Möglichkeit Mahd mit dem Messerbalken-Mäher - Mahd der Flächen vor der ersten Hauptblüte - Zweitschnitt bei guter Entwicklung nach 8 – 10 Wochen - Abräumen des Mahdguts nach 2 – 14 Tagen - Bei gutem Entwicklungszustand der Mahd der Wiesenflächen abschnittsweise 	2 x jährlich oder 1 x jährlich
Ruderalvegetation (an Böschungen)	<ul style="list-style-type: none"> - Ruderalvegetation je nach erreichtem Zielzustand 1 – 2-mal ausmähen. - Aufkommendes Gestrüpp und aufkommende Gehölze entfernen - Bestehende naturraumtypische Gehölze (z.B. Schwarzdorn, Rosen) erhalten, bei ungewünschter Ausbreitung zurückschneiden - Aufkommende Goldruten-Bestände vor der 1. Und 2. Blüte mähen 	1 - 2 x jährlich 1 x jährlich 1 x jährlich 2 x jährlich
Lösswände	<ul style="list-style-type: none"> - Wände von Bewuchs freihalten, ggf. Rückschnitt/Mahd des aufkommenden Bewuchses - Ggf. Lösswände mechanisch zwischen September und Februar nacharbeiten, um steilen Böschungswinkel zu erhalten 	1 x jährlich 1 x jährlich
Hecken / Gebüsche	<ul style="list-style-type: none"> - Ggf. Rückschnitt, Totholz entfernen (ersten 3 - 5 Jahre) - Auf-den-Stock setzen (Abschnittsweise) nach Erreichen des Zielzustandes 	2 – 3 x jährlich Alle 10 – 15 Jahre
Standortuntypische/ unerwünschte Gehölze	Entfernung/ Rodung der aufkommenden Gehölze	Nach Erfordernis